

¹ **Проказа** (по-гречески – *лепра*, *болезнь Хансена*, *хансеноз*, *хансениаз*; устаревшие названия – *проказа*, *elephantiasis graecorum*, *lepra arabum*, *satyriasis*, *lepra orientalis*, *Финикийская болезнь*, *скорбная болезнь*, *крымка*, *ленивая смерть*, *болезнь Святого Лазаря* и др.) – хроническое инфекционное заболевание, протекающее в виде хронического гранулематоза, вызываемое микобактериями (*Mycobacterium Lepre*), с преимущественным поражением кожи, слизистых оболочек, периферической НС, иногда передней камеры глаза, верхних дыхательных путей выше гортани, яичек, а также кистей и стоп. Возбудитель лепры (*Mycobacterium leprae*) был открыт в 1871 г. в Норвегии Хансенom Г. А. Он работал в госпитале Святого Йоргеса (основан в XV в.) в Бергене. Сейчас это музей, возможно лучше всего сохранившийся лепрозорий в Северной Европе. Инкубационный период обычно составляет 3–5 лет, но может колебаться от шести месяцев до нескольких десятилетий. Различают: лепроматозный тип (наиболее тяжелая и заразная форма лепры), туберкулоидный тип (наиболее благоприятная форма лепры) и пограничные (промежуточные) группы (сочетают признаки обоих полярных типов).